



HAZAR TEB TEHRAN

ESTRON



۹ دوره پرهیز از مصرف: زمان منع مصرف برای گوشت یک روز ولی برای شیر منعی وجود ندارد.

۱۰ شرایط نگهداری: در جای خنک با درجه ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم نگهداری شود.



شرکت هزار طب تهران
سعادت آباد، علامه جنوبی، ساختمان توس، طبقه ۶، واحد ۱۱۰
تلفن: ۸۸۶۹۲۸۲۸ (+۲۱)
فاکس: ۸۸۶۹۰۸۰۸ (+۲۱)

۱ کمیانی سازنده: بیووتا، جمهوری چک
وارد کننده انحصاری: شرکت هزار طب تهران

۲ هورمون استرون Estron

۳ هر میلی لیتر محتوی ۰/۲۵ میلی گرم کلوپروستنول سدیم می باشد.

۴ موارد مصرف: همزمانی و ایجاد فحلی در گاو تلیسه و مادبان و گوسفند

در گاو درمان اختلال در تخمک گذاری - عدم آبستنی و فحلی بعد از جفت گیری و زایمان مانند فحلی خاموش - سیکل نامنظم و یا بدون تخمک - جسم زرد مقاوم و کیست تخمدان و بیماری های رحمی مانند اندومتیریت و پیومتر - قطع حاملگی طبیعی یا پاتولوژیک در طی سه ماهه اول و درمان کیست های نو سیکلی همزمان با درمان HCG و LHRH در مادبان عدم فحلی (فحلی خاموش) در

استروس مقاوم - نکرور جنین - عدم فحلی دوره شیرواری - بارداری کاذب و عدم آبستنی طبیعی و پاتولوژیک.

۵ موارد منع مصرف: در دوران حاملگی فیزیولوژیکی مخصوصا در نیمه دوم

۶ عوارض جانبی: تعریق خفیف - بعد از ۱ تا ۶ ساعت برطرف خواهد شد.

۷ حیوان هدف: گاو تلیسه، مادبان و گوسفند

۸ دوز مصرفی:

گاو: تزریق ۲ میلی لیتر دوبار به فاصله ۱۰ روز که تزریق اول در هر مرحله از سیکل فحلی می تواند بکار رود (۴۰ تا ۵۰ روز بعد از زایمان) و تزریق دوم باید ۱۱ روز بعد از تزریق اول صورت گیرد و تلقیح اول و دوم باید در روز ۱۴ یا ۱۲ تا ۷۶ ساعت بعد از تزریق دوم و لو اینکه علائم فحلی دیده نشود باید صورت پذیرد.

مادبان: تزریق ۱ میلی لیتر از هورمون در فاصله روز ۵ تا ۱۳ بعد از مشاهده فحلی بعد از تزریق مختصری عرق کردن در حیوان اتفاق می افتد که بعد از ۱ تا ۶ ساعت از بین خواهد رفت.

گوسفند: تزریق ۰/۵ میلی لیتر از هورمون استرون کافی است.

